

FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

07 de marzo de 2012

feliz día de la mujer



*Mirada tierna, sonrisa seductora,
Un sueño del hombre es siempre tenerla.
Junto a ellas imaginan miles de cosas,
Escriben los poetas en sus prosas,
Regalan la luna y miles de rosas.*

*Maravillosa creación de Dios,
ante los problemas de la vida
jamás se dará por vencida,
ofrece consejo y compañía.*

*Créa vida en sus entrañas
y lucha por los que quiere,
trabaja para un mejor mañana,
brindando ilusión y esperanza.*

*Es la única en el universo,
más que madre es una amiga.
No existe un amor comparable
al de una mujer y una madre.*

Autor: Arjona Delia

JHON WILMER ROJAS




CANCER DE CUELLO UTERINO

- ◉ EL CANCER DE CUELLO UTERINO ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE POR CANCER EN NUESTRO PAIS, EN MUJERES ENTRE LOS 30 Y 59 AÑOS Y LA SEGUNDA EN EL MUNDO
- ◉ ESTA AMPLIAMENTE DEMOSTRADO QUE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) ES EL RESPONSABLE
- ◉ EL CONSENSO MUNDIAL SEÑALA QUE PARA PREVENIRLO DEBEMOS REALIZAR ANUALMENTE LA CITOLOGIA...



HAGASE RESPONSABLE DE SU SALUD: PREVenga....

QUE ES...



- ◉ ES EL CRECIMIENTO ANORMAL O POCO CONTROLADO DE LAS CELULAS DEL CUELLO UTERINO(CERVIX) TRANSFORMANDOLAS EN MALIGNAS.
- ◉ ES CAUSADA POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO, HPV, QUE SE TRASMITE POR CONTACTO SEXUAL (CUALQUIER HOMBRE O MUJER, SIN IMPORTAR SU ORIENTACION SEXUAL, PUEDE TENER EL VIRUS Y TRASMITIRLO
- ◉ CADA AÑO SE DIAGNOSTICAN EN EL PAIS 6,815 NUEVOS CASOS DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y OCURREN 3,296 MUERTES.
- ◉ EN AMERICA LATINA LA CIFRA DE CASOS DETECTADOS ANUALMENTE ASCIENDE A 72,000 POR AÑO Y 33,000 MUERTES POR ESTA CAUSA. EN EL MUNDO SON DIAGNOSTICADOS 500,000 CASOS ANUALES DE LOS CUALES MUEREN 270,000 MUJERES



FACTORES DE RIESGO.....

LOS FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER CERVICAL ESTÁN RELACIONADOS CON CARACTERÍSTICAS TANTO DEL VIRUS COMO DEL HUÉSPED, E INCLUYEN:

- MÚLTIPLES COMPAÑEROS SEXUALES
- UNA PAREJA MASCULINA CON MUCHAS COMPAÑERAS SEXUALES PRESENTES O PASADOS
- EDAD TEMPRANA EN LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL
- ELEVADO NÚMERO DE PARTOS
- INFECCIÓN PERSISTENTE CON UN VPH DE ALTO RIESGO
- OTRAS INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL
- USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES
- FUMAR.

...COMO SE MANIFIESTA... CUADRO CLINICO...

- ◉ MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS DE CÁNCER CERVICAL SE DETECTAN EN MUJERES QUE NO PARTICIPAN EN REVISIONES REGULARES.

LO MÁS FRECUENTE ES QUE SEA ASINTOMÁTICO.

LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS SON:

- ◉ SANGRADO VAGINAL ANORMAL, EN "AGUA DE LAVAR CARNE" (CUANDO DA SÍNTOMAS, ES EL PRIMERO EN APARECER)
- ◉ AUMENTO DE FLUJO VAGINAL
- ◉ DOLOR EN EL VIENTRE BAJO O PUBIS
- ◉ DOLOR EN LA RELACION SEXUAL
- ◉ SANGRADO DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES




Imagen colposcópica de lesión anatómica en cuello uterino.

DIAGNOSTICO.....



...COMO SE DETECTA

- ◉ EL UNICO METODO PARA DETECTAR ANOMALIAS EN EL CUELLO DEL UTERO ES LA
CITOLOGIA VAGINAL
QUE ES...
- ◉ ES UN EXAMEN MEDIANTE EL CUAL SE ANALIZAN LAS CELULAS DEL CUELLO UTERINO DE LA MUJER , PARA DETECTAR O DESCARTAR LA PRESENCIA DE CELULAS ANORMALES O CANCEROSAS



- ◉ ES UN EXAMEN MEDIANTE EL CUAL SE ANALIZAN LAS CELULAS DEL CUELLO UTERINO DE LA MUJER , PARA DETECTAR O DESCARTAR LA PRESENCIA DE CELULAS ANORMALES O CANCEROSAS



VPH:
Siglas para cuidarse

- POR ESO ES FUNDAMENTAL PRACTICARSELA PERIODICAMENTE, RECLAMAR EL RESULTADO Y SEGUIR LAS INDICACIONES DEL PROFESIONAL DE LA SALUD
- SI EN LA CITOLOGIA SE DETECTA ALGUNA ALTERACION O ANOMALIA PROVOCADA POR EL HPV ES INDISPENSABLE ACUDIR A LA CONSULTA CON GINECOLOGIA PARA QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO DE ACUAERDO AL CASO

COMO SE PREVIENE



- ◉ LA PREVENCIÓN ES DE VITAL IMPORTANCIA POR ELLO ES INDISPENSABLE:
- ◉ REALIZARSE PERIÓDICAMENTE LA CITOLOGIA, QUE SIGUE SIENDO LA FORMA MAS EFECTIVA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIRUS EN EL ORGANISMO.
- ◉ EL USO DEL CONDÓN, A PESAR DE NO SER 100% EFECTIVO PARA LA PREVENCIÓN DEL HPV, DISMINUYE EL RIESGO DE INFECCIÓN.
- ◉ EVITAR RELACIONES CON MÚLTIPLES COMPAÑEROS SEXUALES SIN UTILIZAR PRESERVATIVO.
- ◉ APLICÁNDOSE EL ESQUEMA COMPLETO DE VACUNACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO
- ◉ NO FUMAR, NO BEBER.
- ◉ SI SE DETECTA EN VIRUS A TIEMPO Y SE REALIZA EL TRATAMIENTO OPORTUNO DE LAS LESIONES PRECANCEROSAS SE EVITA QUE AUMENTEN EL NUMERO DE MUERTES POR ÉSTE TIPO DE CÁNCER.

QUIENES DE DEBEN VACUNAR

- ◉ EN COLOMBIA ESTA VACUNA ESTA APROBADA POR EL INVIMA PARA MUJERES A PARTIR DE LOS 10 AÑOS DE EDAD
- ◉ EL MOMENTO IDEAL DE VACUNARSE ES ANTES DE INICIAR RELAXCIONES SEXUALES.
- ◉ LA VACUNA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO ES UN MEDICAMENTO, POR LO TANTO ES INDISPENSABLE QUE LA MUJER CONSULTE A UN PROFESIONAL DE LA SALUD ANTES DE VACUNARSE



ESQUEMA DE VACUNACION

CONSISTE EN 3 DOSIS, QUE SE APLICAN UNICAMENTE A LAS MUJERES POR VIA INTRAMUSCULAR EN EL HOMBRO.

- PRIMERA DOSIS: EJ: 15 DE ABRIL
- SEGUNDA DOSIS: AL MES DE LA APLICACIÓN DE LA PRIMERA
- TERCERA DOSIS: A LOS 6 MESES DE LA SEGUNDA DOSIS

**TÚ ERES BELLA POR DENTRO
Y POR FUERA...**



**NO DEJES QUE EL CÁNCER
DE CUELLO DE ÚTERO
LLEGUE A TI!**

**LIGA
CONTRA
CÁNCER**